

サンワロン

はち み じ おう がん

八味地黄丸 による

サンワロンは、漢方処方「八味地黄丸」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
そ の 他	のぼせ、どうき

(2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

* 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられる場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

下 痢

成 分

本品 1 日量 15 錠（1 錠 0.3 g） 中
サンワロン水製エキス 1.5 g

ジ オ ウ 1.80 g	タ ク シ ャ 1.05 g
サ ン ヤ ク 1.05 g	ボ タ ン ビ 1.05 g
サ ン シ ュ ユ 1.05 g	ケ イ ヒ 0.60 g
ブ ク リ ョ ウ 1.05 g	

加工ブシ末 1.5 g

添加物として、カルボキシメチルセルロース Ca、ステアリン酸 Ca、メタケイ酸アルミン酸 Mg を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

適応症

下腹部軟弱、腰に冷痛あり、尿利減少または頻数で全身または手足に熱感あるもの

慢性腎炎、糖尿病、水腫、脚気のむくみ、膀胱カタル腰痛、五十肩、肩こり

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	5 錠
15 才 未 満	服用しないこと



三 和 生 薬 株 式 会 社
宇都宮市平出工業団地 6 - 1

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171（代）