

サンワ

ぶくりょうたくしゃとう  
茯苓沢瀉湯

エキス細粒

サンワ茯苓沢瀉湯エキス細粒は、漢方処方「茯苓沢瀉湯」の水製エキスを服用しやすい細粒にしたもので



## 使用上の注意



## 相談すること

## 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことのある人。
- (5) 次の症状のある人。  
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

## 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症 状 の 名 称           | 症 状   |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

## 3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

| 年 令       | 1 回 量   |
|-----------|---------|
| 大人(15才以上) | 2.0 g   |
| 7才～14才    | 1.3 g   |
| 4才～6才     | 1.0 g   |
| 4才未満      | 服用しないこと |

## 〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成 分

本品1日量 ..... 6 g 中  
茯苓沢瀉湯水製エキス ..... 1.9 g

|       |       |        |       |
|-------|-------|--------|-------|
| ブクリョウ | 3.2 g | ショウキョウ | 0.8 g |
| タクシャ  | 3.2 g | ケイヒ    | 1.6 g |
| ソウジュツ | 2.4 g | カンゾウ   | 1.2 g |

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

## ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室

東京都千代田区外神田6-6-1

TEL 03-3834-2171 (代)

(月～金曜日 10:00～17:00 但し祝日を除く)

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。

## 適応症

体力中等度以下で、胃のもたれ、悪心、嘔吐のいずれかがあり、渴きを覚えるものの次の諸症：

胃炎、胃腸虚弱



三和生薬株式会社

栃木県宇都宮市平出工業団地6-1