

サンワ

ぶくりょうたくしゃ とう
茯苓沢瀉湯

エキス細粒「分包」

サンワ茯苓沢瀉湯エキス細粒「分包」は、漢方処方「茯苓沢瀉湯」の水製エキスを服用しやすい細粒剤の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

適応症

吐いて渴きを覚えるものの次の諸症：
胃炎、胃アトニー

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	1 包
7才～14才	2/3 包
4才～ 6才	1/2 包

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品1日量 …… [3包（1包 2g）] 中
茯苓沢瀉湯水製エキス …… 1.9g

ブクリョウ …… 3.2g	ショウキョウ …… 0.8g
タクシャ …… 3.2g	ケイヒ …… 1.6g
ソウジュツ …… 2.4g	カンゾウ …… 1.2g

添加物として乳糖，トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171



三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地6-1