

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

サンワ ^{へい い さん}平胃散 エキス細粒

サンワ平胃散エキス細粒は、漢方処方「平胃散」の水製エキスを服用しやすい細粒剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

＊(2) 1 ヶ月位（急性胃カタルに服用する場合には 5 ～ 6 回）服用しても症状がよくなる場合

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

適応症

胃がもたれて消化不良の傾向のある次の諸症：
急・慢性胃カタル、胃アトニー、消化不良、食欲不振

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	2.0 g
7 才～14 才	1.3 g
4 才～ 6 才	1.0 g

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品 1 日量 …………… 6 g 中

平胃散料水製エキス …… 2.1 g

ソウジュツ …… 3.2 g	カンゾウ …… 0.8 g
コウボク …… 2.4 g	ショウキョウ …… 0.4 g
チ ン ピ …… 2.4 g	タイソウ …… 1.6 g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171



三和生薬株式会社

宇都宮市平出工業団地 6-1