

サンワ 平胃散 エキス細粒

サンワ平胃散エキス細粒は、漢方処方「平胃散」の水製エキスを服用しやすい細粒にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1 ヶ月位（急性胃炎に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成 分

本品 1 日量 …………… 6 g 中

平胃散料水製エキス …… 2.1 g

ソウジュツ …… 3.2 g	カンゾウ …… 0.8 g
コウボク …… 2.4 g	ショウキョウ …… 0.4 g
チ ン ピ …… 2.4 g	タイソウ …… 1.6 g
上記の生薬より抽出したエキス	

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

＊消費者くすり相談室 TEL 0570-095770
10：00～17：00（土、日、祝日を除く）

適応症

体力中等度以上で、胃がもたれて消化が悪く、ときにはきけ、食後に腹が鳴って下痢の傾向のあるものの次の諸症：
食べ過ぎによる胃のもたれ、急・慢性胃炎、消化不良、食欲不振

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	2.0 g
7才～14才	1.3 g
4才～ 6才	1.0 g
4才 未 満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1