

ぼ う い お う ぎ と う
サンワ 防己黄耆湯 エキス細粒

サンワ防己黄耆湯エキス細粒は、漢方処方「防己黄耆湯」の水製エキスを服用しやすい細粒剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
＊＊間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、 発熱等があらわれる。
＊肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目 が黄色くなる）等があらわれる。

(2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

成 分

本品 1 日量 6 g 中
防己黄耆湯水製エキス 2.0 g

ボ ウ イ 3.0 g	ショウキョウ 0.6 g
オ ウ ギ 3.0 g	タイソウ 1.8 g
ソウジュツ 1.8 g	カンゾウ 0.9 g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171（代）

適応症

色白で疲れやすく、汗のかきやすい傾向のある次の諸症：
肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）、
関節痛、むくみ

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	2.0 g
7 才～14 才	1.3 g
4 才～ 6 才	1.0 g

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに
服用させること。



三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地 6-1