

ま おう とう
サンワ 麻 黄 湯 エキス細粒

サンワ麻黄湯エキスを細粒は、漢方処方「麻黄湯」の水製エキスを服用しやすい細粒にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないこと
体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
2. 短期間の服用にとどめ、連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - （1）医師の治療を受けている人。
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - （3）胃腸の弱い人。
 - （4）発汗傾向の著しい人。
 - （5）高齢者。
 - （6）今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - （7）次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - （8）次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - （1）服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感
そ の 他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- （2）5～6回服用しても症状がよくなる場合

適応症

体力充実して、かぜのひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：

感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり
〈使用上の注意：身体虚弱の人は使用しないこと〉

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	2.0 g
7才～14才	1.3 g
4才～6才	1.0 g
4才未満	服用しないこと

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品1日量 …………… 6 g 中
麻黄湯水製エキス …………… 1.4 g

マ オ ウ ……………	5.0 g
キ ョ ウ ニ ン ……………	5.0 g
ケ イ ヒ ……………	4.0 g
カ ン ゴ ウ ……………	1.5 g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン含有する。

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- （2）小児の手の届かない所に保管すること。
- （3）他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171（代）

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社
宇都宮市平出工業団地6-1