

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

サンワ ^{ま おう とう} 麻 黄 湯 エキス細粒「分包」

サンワ麻黄湯エキス細粒「分包」は、漢方処方「麻黄湯」の水製エキスを服用しやすい細粒剤の分包にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと

- ＊(1) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- ＊(2) 短期間の服用にとどめ、連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- ＊(3) 胃腸の弱い人。
- ＊(4) 発汗傾向の著しい人。
 - (5) 高齢者。
 - (6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- ＊(7) 次の症状のある人。

むくみ、排尿困難
- ＊(8) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- ＊(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	1 包
7才～14才	2/3 包
4才～ 6才	1/2 包

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品1日量 …… [3包（1包 2g）] 中
麻黄湯水製エキス …… 1.4g

マ オ ウ ……	5.0g
キ ョ ウ ニ ン ……	5.0g
ケ イ ヒ ……	4.0g
カ ン ゾ ウ ……	1.5g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171

適応症

風邪のひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、身体のふしぶしが痛い場合の次の諸症：
感冒、鼻かぜ



三 和 生 薬 株 式 会 社
宇都宮市平出工業団地 6－1