

# サンワ 麻黄湯 エキス細粒「分包」

サンワ麻黄湯エキス細粒「分包」は、漢方処方「麻黄湯」の水製エキスを服用しやすい細粒剤の分包にしたものです。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

#### 次の人は服用しないこと

- (1) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (2) 短期間の服用にとどめ、連用しないこと



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。
- (4) 発汗傾向の著しい人。
- (5) 高齢者。
- (6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状           |
|-------|---------------|
| 消 化 器 | 悪心、食欲不振、胃部不快感 |
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ     |
| そ の 他 | 発汗過多、全身脱力感    |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症 状 の 名 称 | 症 状                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

## 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

| 年 令       | 1 回 量 |
|-----------|-------|
| 大人（15才以上） | 1 包   |
| 7才～14才    | 2/3 包 |
| 4才～ 6才    | 1/2 包 |

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成 分

本品1日量 …… [3包（1包 2g）] 中  
麻黄湯水製エキス …… 1.4g

|              |      |
|--------------|------|
| マ オ ウ ……     | 5.0g |
| キ ョ ウ ニ ン …… | 5.0g |
| ケ イ ヒ ……     | 4.0g |
| カ ン ゴ ウ ……   | 1.5g |

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

## 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

## ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社  
TEL 03-3834-2171（代）

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。

## 適応症

風邪のひきはじめで、さむけがして発熱、頭痛があり、身体のふしぶしが痛い場合の次の諸症：

感冒、鼻かぜ



三 和 生 薬 株 式 会 社  
宇都宮市平出工業団地6－1