

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

ま し にん がん りょう
サンワ 麻子仁丸料 エキス細粒「分包」

サンワ麻子仁丸料エキス細粒「分包」は、漢方処方「麻子仁丸料」の水製エキスを服用しやすい細粒剤の分包にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
- * 2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は
授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- * (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師
又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
* 消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
- * (2) 5～6 日間服用しても症状がよくなる場合
- * 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の
継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は
薬剤師に相談すること

下痢

成 分

本品 1 日量 …………… [3 包 (1 包 2 g)] 中
麻子仁丸料水製エキス …………… 2.1 g

マシニン	5 g
シャクヤク	2 g
キ ジ ツ	2 g
コウボク	2 g
ダイオウ	4 g
キョウニン	2 g

添加物として乳糖，トウモロコシデンプン含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管
すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり
品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171

適応症

便秘

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人 (15 才以上)	1 包
7 才～14 才	2/3 包
4 才～ 6 才	1/2 包

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに
服用させること。



三 和 生 薬 株 式 会 社
宇都宮市平出工業団地 6-1