

ま し にん がんりょう  
**サンワ 麻子仁丸料 エキス細粒「分包」**

サンワ麻子仁丸料エキス細粒「分包」は、漢方処方「麻子仁丸」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
    - (1) 医師の治療を受けている人。
    - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
    - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- | 関係部位  | 症 状            |
|-------|----------------|
| 消 化 器 | はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
下痢
  4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

| 年 令       | 1 回 量   |
|-----------|---------|
| 大人（15才以上） | 1 包     |
| 7才～14才    | 2/3 包   |
| 4才～6才     | 1/2 包   |
| 4才未満      | 服用しないこと |

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

### 成 分

本品1日量 …………… 3包（1包 2g）中  
麻子仁丸料水製エキス …………… 2.1g

|                 |          |
|-----------------|----------|
| マシニン            | …………… 5g |
| シャクヤク           | …………… 2g |
| キ ジ ツ           | …………… 2g |
| コウボク            | …………… 2g |
| ダイオウ            | …………… 4g |
| キョウニン           | …………… 2g |
| *上記の生薬より抽出したエキス |          |

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン含有する。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- \* (4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

### ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室

東京都千代田区外神田 6-6-1

T E L 03-3834-2171（代）

（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

### 適応症

体力中等度以下で、ときに便が硬く塊状なものの次の諸症：  
便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの  
（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和



**三 和 生 薬 株 式 会 社**  
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。