

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

ま し にん がん りょう
サンワ 麻子仁丸料 エキス錠

サンワ麻子仁丸料エキス錠は、漢方処方「麻子仁丸料」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）

＊2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

＊(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
＊消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

＊(2) 5～6 日間服用しても症状がよくなる場合

＊3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

下 痢

適応症

便秘

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	6 錠
7 才～14 才	4 錠
5 才～ 6 才	3 錠
5 才 未 満	服用しないこと

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品 1 日量 …… [18 錠（1 錠 0.3 g）] 中
麻子仁丸料水製エキス …… 2.1 g

マシニン	5 g
シャクヤク	2 g
キ ジ ツ	2 g
コウボク	2 g
ダイオウ	4 g
キョウニン	2 g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、カルボキシメチルセルロース、結晶セルロース、ステアリン酸 Ca、ヒドロキシプロピルスターチを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● **お問い合わせ先**

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171



三 和 生 薬 株 式 会 社
宇都宮市平出工業団地 6-1