

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

よく い にん とう

サンワ 薏苡仁湯 エキス細粒

サンワ薏苡仁湯エキス細粒は、漢方処方「薏苡仁湯」の水製エキスを服用しやすい細粒剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - ＊(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - ＊(4) 胃腸の弱い人。
 - ＊(5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - ＊(8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - ＊(9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

成 分

本品 1 日量 6 g 中
薏苡仁湯水製エキス 2.4 g

マ オ ウ 2.0 g	ケ イ ヒ 1.5 g
ト ウ キ 2.0 g	シャクヤク 1.5 g
ビャクジュツ 2.0 g	カンゾウ 1.0 g
ヨクイニン 4.0 g	

添加物として乳糖，トウモロコシデンプンを含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171

適応症

関節痛，筋肉痛

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	2.0 g
7才～14才	1.4 g
4才～ 6才	1.0 g

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。



三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地 6-1