

サンワロン C 顆粒

かつこん かじゅつぶ とう

葛根加朮附湯による

サンワロン C 顆粒は、漢方処方「葛根加朮附湯」の水製エキスを服用しやすい顆粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 著しく胃腸の弱い人。
- (4) 発汗傾向の著しい人。
- (5) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
そ の 他	動悸、のぼせ、ほてり

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、 徐々に強くなる。

3. 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成 分

本品 1 日量 …………… 9 包（1 包 0.8 g） 中
サンワロン C 水製エキス …………… 3.375 g

カッコン……………	4.500 g	ソウジュツ……………	3.375 g
マ オ ウ……………	3.375 g	ケ イ ヒ……………	2.250 g
ショウキョウ……………	3.375 g	シャクヤク……………	2.250 g
タイソウ……………	3.375 g	カンゾウ……………	2.250 g

加工ブシ末 …………… 1.125 g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸 Ca を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室

東京都千代田区外神田 6-6-1

T E L 03-3834-2171（代）

（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

適応症

悪感発熱して頭痛があり、項部、肩背部に緊張感あるもの。
肩こり・肩甲部の神経痛・上半身の関節リウマチ。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食後に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	1～3 包
15 才 未 満	服用しないこと



三 和 生 薬 株 式 会 社

栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1