

サンワロン D

だい ぼう ふう とう
大 防 風 湯 による

サンワロンDは、「大防風湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 著しく胃腸の弱い人。
- (5) 高齢者。
- (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。
むくみ
- (8) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感
そ の 他	動悸、のぼせ、ほてり

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1 ヶ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	10 錠
15才 未 満	服用しないこと

成 分

本品1日量 …………… 30錠（1錠 0.3g） 中

サンワロンD水製エキス …………… 5.14g

ト ウ キ …………… 2.57g	ニンジン …………… 1.29g
シャクヤク …………… 2.57g	キョウカツ …………… 1.29g
ジ オ ウ …………… 2.57g	ゴ シ ツ …………… 1.29g
オ ウ ギ …………… 2.57g	カンゾウ …………… 1.29g
ボウフウ …………… 2.57g	ショウキョウ …………… 1.29g
トチュウ …………… 2.57g	タイソウ …………… 1.29g
ビャクジュツ …………… 2.57g	

加工ブシ末 …………… 0.86g

添加物として乳糖、カルメロースCa、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Caを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室

東京都千代田区外神田 6-6-1

T E L 03-3834-2171（代）

（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

適応症

関節がはれて痛み、麻痺、強直して屈伸しがたいもの。
下肢の関節リウマチ。 慢性関節炎 痛風。



三 和 生 薬 株 式 会 社
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1