

サンワロン D 顆粒

だい ぼう ふう とう
大 防 風 湯 による

サンワロンD顆粒は、「大防風湯」の水製エキスを服用しやすい顆粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 著しく胃腸の弱い人。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感
そ の 他	動悸、のぼせ、ほてり

3. 1 ヶ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成 分

本品1日量 …………… 3包（1包 1.0g）中
 サンワロンD水製エキス …………… 1.29g

ト ウ キ …………… 0.643 g	ニンジン …………… 0.321 g
シャクヤク …………… 0.643 g	キョウカツ …………… 0.321 g
ジ オ ウ …………… 0.643 g	ゴ シ ツ …………… 0.321 g
オ ウ ギ …………… 0.643 g	カンゾウ …………… 0.321 g
ボウフウ …………… 0.643 g	ショウキョウ …………… 0.321 g
トチュウ …………… 0.643 g	タイソウ …………… 0.321 g
ソウジュツ …………… 0.643 g	

加工ブシ末 …………… 0.21 g

添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖、ステアリン酸 Ca を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室
 東京都千代田区外神田 6-6-1
 T E L 03-3834-2171（代）
 （月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

適応症

関節がはれて痛み、麻痺、強直して屈伸しがたいもの。
 下肢の関節リウマチ・慢性関節炎・痛風。

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食後に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	1 包
15才 未 満	服用しないこと

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社
 栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1