

サンワロン D 顆粒

だい ぼう ふう とう
大 防 風 湯 による

サンワロンD顆粒は、「大防風湯」の水製エキスを服用しやすい顆粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 著しく胃腸の弱い人。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感
そ の 他	動悸、のぼせ、ほてり

3. 1 ヶ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成 分

本品1日量 …………… 3包（1包 1.0g）中
サンワロンD水製エキス …………… 1.29g

トウキ …………… 0.643g	ニンジン …………… 0.321g
シャクヤク …………… 0.643g	キョウカツ …………… 0.321g
ジオウ …………… 0.643g	ゴシツ …………… 0.321g
オウギ …………… 0.643g	カンゾウ …………… 0.321g
ボウフウ …………… 0.643g	ショウキョウ …………… 0.321g
トチュウ …………… 0.643g	タイソウ …………… 0.321g
ソウジュツ …………… 0.643g	

加工ブシ末 …………… 0.21g

添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖、ステアリン酸Caを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

適応症

関節がはれて痛み、麻痺、強直して屈伸しがたいもの。
下肢の関節リウマチ・慢性関節炎・痛風。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室
東京都千代田区外神田 6-6-1
TEL 03-3834-2171（代）
（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食後に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	1 包
15才未満	服用しないこと

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1