

漢方製剤

サンワロン M

麻黄附子細辛湯 製剤

サンワロンMは、漢方処方「麻黄附子細辛湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 著しく胃腸の弱い人。
- (4) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (5) 発汗傾向の強い人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、嘔吐、胃部圧迫感
そ の 他	どうき、のぼせ、発汗過多

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

- (2) 1ヶ月位(感冒の場合は5～6日間)服用しても症状がよくなる場合

〔用法・用量〕

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	5 錠
7 才～14 才	3 錠
5 才～6 才	2 錠
5 才 未 満	服用しないこと

食間とは……

食後2～3時間を指します。

＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・分量〕

本品1日量……………15錠(1錠0.3g)中

サンワロンM水製エキス……………1.5g

〔日局マ オ ウ……………6.0g〕
〔日局サイシン……………4.5g〕

日局ブシ末……………1.5g

添加物として、乳糖水和物、カルボキシメチルセルロースCa、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Caを含有しています。

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 吸湿しやすいため、服用のつどビンのフタをよくしめること。
- (5) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を用いた製品なので、製品により色調等が異なることがあるが、効能・効果には変わりありません。
- (6) 本剤をぬれた手で扱わないこと。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがある。

〔効能・効果〕

悪感、微熱、全身倦怠、低血圧で頭痛、めまいあり 四肢に疼痛、冷感あるもの。

感冒、気管支炎、咳嗽

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171

発 売 元 ジェーピーエス製薬株式会社
横浜市都筑区東山田4-42-22
製造販売元 三 和 生 薬 株 式 会 社
宇都宮市平出工業団地6-1