

サンワロン M

ま お う ふ し さい し ん と う
麻黄附子細辛湯による

サンワロン M は、漢方処方「麻黄附子細辛湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 著しく胃腸の弱い人。
- (4) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、嘔吐、胃部不快感
そ の 他	どろき、のぼせ、発汗過多

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1 カ月位（感冒の場合は 5 ～ 6 日間）服用しても症状がよくなる場合

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	5 錠
7 才～14 才	3 錠
5 才～6 才	2 錠
5 才 未 満	服用しないこと

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品 1 日量 …………… 1.5 錠（1 錠 0.3 g） 中
サンワロン M 水製エキス …………… 1.5 g

〔 マ オ ウ …………… 6.0 g
サイシン …………… 4.5 g 〕
加工ブシ末 …………… 1.5 g

添加物として乳糖、カルメロース Ca、メタケイ酸アルミン酸 Mg、ステアリン酸 Ca を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171（代）

適応症

悪感、微熱、全身倦怠、低血圧で頭痛、めまいあり 四肢に疼痛、冷感あるもの。
感冒、気管支炎、咳嗽



三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地 6-1

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。