

# サンワロン M

ま お う ふ し さい し ん と う  
麻黄附子細辛湯 による

サンワロンMは、漢方処方「麻黄附子細辛湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



## 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 胃腸の弱い人。
  - のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
  - 発汗傾向の著しい人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
排尿困難
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位  | 症 状                          |
|-------|------------------------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ                    |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感            |
| そ の 他 | 発汗過多、全身倦怠感、発熱、動悸、<br>のぼせ、ほてり |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症 状                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白<br>目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだる<br>さ、食欲不振等があらわれる。 |

- 1 ヶ月位（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 適応症

体力虚弱で、手足に冷えがあり、ときに悪寒があるものの次の諸症：  
感冒、アレルギー性鼻炎、気管支炎、気管支ぜんそく、神経痛

## 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

| 年 令       | 1 回 量   |
|-----------|---------|
| 大人（15才以上） | 5 錠     |
| 7才～14才    | 3 錠     |
| 5才～6才     | 2 錠     |
| 5才未満      | 服用しないこと |

### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成 分

本品1日量 …………… 15錠（1錠 0.3g） 中  
サンワロンM水製エキス …………… 1.5g

|             |       |
|-------------|-------|
| マ オ ウ …………… | 6.0 g |
| サイシン ……………  | 4.5 g |

加工ブシ末 …………… 1.5g

添加物として乳糖、カルメロース Ca、メタケイ酸アルミン酸 Mg、ステアリン酸 Ca を含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- \* (4) 乾燥剤は捨てないこと。また、誤って飲み込まないようにすること。

## ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室  
東京都千代田区外神田 6-6-1  
T E L 03-3834-2171（代）  
（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社  
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1