

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第②類医薬品

漢方製剤

サンワロンM顆粒

(麻黄附子細辛湯)

マオウブ シサイシントウ

特 徴

- 「サンワロンM顆粒」は、「麻黄附子細辛湯」エキスを顆粒にしたものです。「麻黄附子細辛湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書「傷寒論」の少陰病篇に記載されている薬方で、特に疲労感があり、悪感の強い感冒に用いられてきました。また、浅田宗伯の「勿誤方函口訣」には痰の多い咳嗽(せき)、感冒が長びいて疲れている者に効果があると記載されています。
- 悪感、微熱、低血圧で頭痛、めまいあり、四肢に疼痛冷感あるもの、感冒、気管支炎、咳嗽(せき)にすぐれた効果があります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸の弱い人
- (5) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
- (6) 発汗傾向の著しい人
- (7) 高齢者
- (8) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (9) 次の症状のある人
排尿困難
- (10) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、嘔吐、胃部圧迫感
そ の 他	どうき、のぼせ、発汗過多

まれに裏面の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

(裏面につづきます)

症状の名称	症状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1ヶ月位（感冒の場合は5～6回）服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

効 能

悪寒、微熱、低血圧で頭痛 めまいあり 四肢に疼痛冷感あるもの。
感冒 気管支炎 咳嗽

用法・用量

次の量を1日3回食前または食間に服用。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15才以上)	1～2包	3回
15才未満	服用しないこと	

成 分

成人1日の服用量6包(1包0.75g)中、次の成分を含んでいます。

サンワロンM水製エキス 1.5g

〔マオウ6.0g、サイシン4.5gより抽出。〕

ブシ末 1.5g


添加物として、トウモロコシデンプン、乳糖、ステアリン酸Caを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限のすぎた商品は服用しないでください。



副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334

受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元 **クラシエ薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **三和生薬株式会社**
栃木県宇都宮市平出工業団地6-1 (〒321-0905)