



JPS 漢方顆粒－81号

漢方製剤

品名 サンワロンM顆粒

本剤は、漢方処方「麻黄附子細辛湯」の水製エキスを服用しやすい顆粒剤の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 著しく胃腸の弱い人。
- (4) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、嘔吐、胃部圧迫感
そ の 他	どうき、のぼせ、発汗過多

まれに下記の重篤な症状が起ることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1ヶ月位（感冒の場合は5～6日間）服用しても症状がよくならない場合

〔用法・用量〕

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	1 ～ 2 包
15 才 未 満	服用しないこと

食間とは……

食後2～3時間を指します。

〔成分・分量〕

本品1日量……………6包(1包0.75g)中

サンワロンM水製エキス……………1.5g

〔日局マオウ……………6.0g〕
〔日局サイシン……………4.5g〕

日局ブシ末……………1.5g

添加物として、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ステアリン酸Caを含有しています。

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 本剤は吸湿性が高いので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してテープ等で封をし、なるべく1日以内に服用すること。
- (5) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を用いた製品なので、製品により色調等が異なることがあるが、効能・効果には変わりありません。

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171(代)

〔効能・効果〕

悪感、微熱、低血圧で頭痛 めまいあり 四肢に疼痛冷感あるもの。

感冒、気管支炎、咳嗽

発 売 元 ジェーピーエス製薬株式会社
横浜市都筑区東山田4-42-22
製造販売元 三 和 生 薬 株 式 会 社
宇都宮市平出工業団地6-1