

第2類医薬品



JPS 漢方顆粒－81号

漢方製剤

販売名 サンワロンM顆粒

本剤は、漢方処方「麻黄附子細辛湯」の水製エキスを服用しやすい顆粒剤の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (6) 発汗傾向の著しい人。
- (7) 高齢者。
- (8) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (9) 次の症状のある人。
排尿困難
- (10) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感
そ の 他	発汗過多、全身倦怠感、発熱、動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔用法・用量〕

次の1回量を1日3回、食前又は食間に服用してください。

年 令	1 回 量
成人(15才以上)	1～2包
15才未満	服用しないこと

〔用法・用量に関連する注意〕

食間とは食後2～3時間を指します。

〔成分・分量〕

本品1日量……………6包(1包0.75g)中
 サンワロンM水製エキス……………1.5g
 〔日局マオウ……………6.0g〕
 〔日局サイシン……………4.5g〕
 日局ブシ末……………1.5g
 添加物として、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、ステアリン酸Caを含有しています。

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 本剤は吸湿性が高いので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してテープ等で封をし、なるべく1日以内に服用してください。
- (5) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なりますが、効能・効果には変わりありません。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室
 東京都千代田区外神田6-6-1
 TEL 03-3834-2171(代)

(月～金曜日 10:00～17:00 但し祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

〔効能・効果〕

体力虚弱で、手足に冷えがあり、ときに悪寒があるものの次の諸症：感冒、アレルギー性鼻炎、気管支炎、気管支ぜんそく、神経痛

発 売 元 ジェーピーエス製薬株式会社
 横浜市都筑区東山田4-42-22
 製造販売元 三和生薬株式会社
 宇都宮市平出工業団地6-1