

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

サンワロン N

ふ し にん しん とう
附子人參湯 による

サンワロン N は、漢方処方「附子人參湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	どうき、のぼせ、ほてり

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合
- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	5 錠
7 才～14 才	3 錠
5 才～ 6 才	2 錠
5 才 未 満	服用しないこと

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品 1 日量 …………… 15 錠（1 錠 0.3 g） 中
サンワロン N 水製エキス …………… 2.0 g

ニンジン …………… 3.0 g	ビャクジュツ …………… 3.0 g
カンゾウ …………… 3.0 g	ショウキョウ …………… 3.0 g

加工ブシ末 …………… 1.0 g

添加物として乳糖、カルボキシメチルセルロース Ca、メタケイ酸アルミン酸 Mg を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171



三 和 生 薬 株 式 会 社
宇都宮市平出工業団地 6-1

適応症

胃腸虚弱で、血色が悪く、顔に生氣なく、尿量多く手足に冷寒あり、下痢の傾向あり、屢々はき氣 目眩、頭重、胃痛をうつたえるもの。

慢性的胃腸カタル、胃アトニー症