

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

サンワロン N 顆粒

ぶ し にん じん とう
附子人參湯による

サンワロン N 顆粒は、漢方処方「附子人參湯」の水製エキスを服用しやすい顆粒剤の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	どうき、のぼせ、ほてり

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食後に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	1 ～ 2 包
15才 未 満	服用しないこと

成 分

本品 1 日量 …………… 6 包（1 包 0.75 g） 中

サンワロン N 水製エキス …………… 2.0 g

ニンジン …………… 3.0 g	ソウジュツ …………… 3.0 g
カンゾウ …………… 3.0 g	ショウキョウ …………… 3.0 g

加工ブシ末 …………… 1.0 g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸 Ca を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171

適応症

胃腸虚弱で血色悪く、顔に生氣なく、尿量多く手足に冷寒あり、下痢の傾向あり、屢々はき気、目眩、頭重、胃痛 をうつたえるもの

慢性の胃腸カタル・胃アトニー症



三 和 生 薬 株 式 会 社

宇都宮市平出工業団地 6-1