

サンワロン S

しん ふ とう
真 武 湯 による

サンワロン S は、漢方処方「真武湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	どうき、のぼせ、ほてり

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

適応症

新陳代謝機能の衰退により四肢や腰部が冷え疲労倦怠感が
著しく尿量減少して下痢し易く動悸やめまいを伴うもの。
胃腸虚弱症、慢性腸カタル、慢性腎炎

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171（代）

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	5 錠
15才未満	服用しないこと

成 分

本品1日量 …………… 15錠（1錠 0.3g） 中
サンワロン S 水製エキス …………… 2.4g

ブクリョウ …………… 3.0g	ショウキョウ …………… 0.6g
シャクヤク …………… 1.8g	ソウジュツ …………… 1.8g

加工ブシ末 …………… 0.6g

添加物として乳糖、カルメロース Ca、メタケイ酸アルミン
酸 Mg、ステアリン酸 Ca を含有する。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が
異なることもございますが、効能・効果にはかわりござい
ません。



三和生薬株式会社

宇都宮市平出工業団地 6-1