

漢方製剤
サンワロン S
真武湯 製剤

サンワロン S は、漢方処方「真武湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	どろき、のぼせ、ほてり

- (2) 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合

〔効能・効果〕

新陳代謝機能の衰退により四肢や腰部が冷え疲労倦怠感が著しく尿量減少して下痢し易く動悸やめまいを伴うもの。

胃腸虚弱症、慢性腸カタル、慢性腎炎

〔用法・用量〕

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用してください。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	5 錠
15 才 未 満	服用しないこと

食間とは……

食後2～3時間を指します。

〔成分・分量〕

本品1日量……………15錠(1錠0.3g)中

サンワロンS 水製エキス……………2.4g

〔日局ブクリョウ……………3.0g 日局シャクヤク……………1.8g〕
〔日局ショウキョウ……………0.6g 日局ソウジュツ……………1.8g〕

日局ブシ末……………0.6g

添加物として、乳糖水和物、カルメロースCa、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Caを含有しています。

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 吸湿しやすいため、服用のつどビンのフタをよくしめてください。
- (5) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を用いた製品ですので、製品により色調等が異なることがありますが、効能・効果には変わりありません。
- (6) 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171(代)

発 売 元 ジェーピーエス製薬株式会社

横浜市都筑区東山田4-42-22

製造販売元 三和生薬株式会社

宇都宮市平出工業団地6-1