

# サンワロン S

しんぶとう  
真 武 湯 による

サンワロン S は、漢方処方「真武湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



## 使用上の注意



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位    | 症 状                 |
|---------|---------------------|
| 皮 膚     | 発疹・発赤、かゆみ           |
| * そ の 他 | 動悸、のぼせ、ほてり、口唇・舌のしびれ |

#### 3. 1 ヶ月位（急性胃腸炎に服用する場合は 5～6 回、下痢、感冒に服用する場合には 5～6 日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 4. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 成 分

本品 1 日量 …………… 15 錠（1 錠 0.3 g） 中  
サンワロン S 水製エキス …………… 2.4 g

〔ブクリョウ …………… 3.0 g ショウキョウ …………… 0.6 g〕  
〔シャクヤク …………… 1.8 g ソウジュツ …………… 1.8 g〕  
加工ブシ末 …………… 0.6 g

添加物として乳糖、カルメロース Ca、メタケイ酸アルミン酸 Mg、ステアリン酸 Ca を含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- \* (4) 乾燥剤は捨てないこと。また、誤って飲み込まないようにすること。

## ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室

東京都千代田区外神田 6-6-1

T E L 03-3834-2171 (代)

(月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く)

## 適応症

体力虚弱で、冷えがあって、疲労倦怠感があり、ときに下痢、腹痛、めまいがあるものの次の諸症：

下痢、急・慢性胃腸炎、胃腸虚弱、めまい、動悸、感冒、むくみ、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ

## 用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

| 年 令        | 1 回 量   |
|------------|---------|
| 大人（15 才以上） | 5 錠     |
| 15 才 未 満   | 服用しないこと |

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社

栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1