

# サンワロン S 顆粒

しんぶとう  
眞武湯 による

サンワロン S 顆粒は、漢方処方「眞武湯」の水製エキスを服用しやすい顆粒の分包にしたものです。



## 使用上の注意



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位    | 症 状                         |
|---------|-----------------------------|
| 皮 膚     | 発疹・発赤、かゆみ                   |
| * そ の 他 | 動悸、のぼせ、ほてり、 <u>口唇・舌のしびれ</u> |

#### 3. 1 ヶ月位（急性胃腸炎に服用する場合は 5～6 回、下痢、感冒に服用する場合には 5～6 日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### 4. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 成 分

本品 1 日量 …………… 6 包（1 包 0.75 g） 中  
サンワロン S 水製エキス …………… 2.4 g

〔ブクリョウ …………… 3.0 g ショウキョウ …………… 0.6 g〕  
〔シャクヤク …………… 1.8 g ソウジュツ …………… 1.8 g〕  
加工ブシ末 …………… 0.6 g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸 Ca を含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

## ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室  
東京都千代田区外神田 6-6-1  
T E L 03-3834-2171（代）

（月～金曜日 10：00～17：00 但し祝日を除く）

## 適応症

体力虚弱で、冷えがあって、疲労倦怠感があり、ときに下痢、腹痛、めまいがあるものの次の諸症：

下痢、急・慢性胃腸炎、胃腸虚弱、めまい、動悸、感冒、むくみ、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ

## 用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

| 年 令        | 1 回 量   |
|------------|---------|
| 大人（15 才以上） | 1～2 包   |
| 15 才 未 満   | 服用しないこと |

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社  
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1