

サンワロン T

けいしゃくちもとう
桂芍知母湯による

サンワロン T は、漢方処方「桂芍知母湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 著しく胃腸の弱い人。

* (5) 発汗傾向の著しい人。

- (6) 高齢者。

- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

* (8) 次の症状のある人。

むくみ、排尿困難

* (9) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感
そ の 他	どうき、のぼせ、ほてり

まれに下記の重篤な症状が起きることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	10 錠
15 才 未 満	服用しないこと

成 分

本品 1 日量 …………… 30 錠（1 錠 0.3 g） 中

サンワロン T 水製エキス …………… 4.8 g

ケイヒ …………… 3.0 g	チモ …………… 3.0 g
ショウキョウ …… 3.0 g	ボウフウ …………… 3.0 g
マオウ …………… 3.0 g	シャクヤク …………… 3.0 g
カンゾウ …………… 1.5 g	ビャクジュツ …… 4.0 g

加工ブシ末 …………… 1.2 g

添加物として乳糖、カルボキシメチルセルロース Ca、ステアリン酸 Ca、メタケイ酸アルミン酸 Mg を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171

適応症

関節の痛み・身体のやせ・脚部の腫脹・めまい・悪心あるもの。
神経痛・関節リウマチ



三 和 生 薬 株 式 会 社

宇都宮市平出工業団地 6-1