

サンワロン T 顆粒

けいしゃくちもとう
桂芍知母湯による

サンワロン T 顆粒は、漢方処方「桂芍知母湯」の水製エキスを服用しやすい顆粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 著しく胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感
そ の 他	どうき、のぼせ、ほてり

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	2 ～ 4 包
15才未満	服用しないこと

成 分

本品1日量 …… 12包（1包 0.75g）中

サンワロン T 水製エキス …… 4.8g

ケイヒ …… 3.0g	チモ …… 3.0g
ショウキョウ …… 3.0g	ボウフウ …… 3.0g
マオウ …… 3.0g	シャクヤク …… 3.0g
カンゾウ …… 1.5g	ソウジュツ …… 4.0g

加工ブシ末 …… 1.2g

添加物としてステアリン酸Ca、トウモロコシデンプン、乳糖を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171（代）

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。

適応症

関節痛み、身体やせ、脚部腫脹し、めまい、悪心あるもの。
神経痛、関節リウマチ



三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地6-1