



JPS 漢方顆粒－83号

漢方製剤

販売名 サンワロン Y 顆粒

本剤は、漢方処方「芍薬甘草附子湯」の水製エキスを服用しやすい顆粒剤の分包にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

短期間の服用にとどめ、連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	どうき、のぼせ、ほてり

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、冷えを伴うものの次の諸症：こむらがえり、筋肉のけいれん、胃痛、腹痛、腰痛、神経痛

〔用法・用量〕

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	1 ～ 2 包
15 才 未 満	服用しないこと

— 食間とは…… —

食後2～3時間を指します。

〔成分・分量〕

本品1日量……………6包(1包0.75g)中

サンワロンY水製エキス……………1.5g

〔日局シャクヤク……………4.5g〕
〔日局カンゾウ……………4.5g〕

日局ブシ末……………1.5g

添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Caを含有しています。

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 本剤は吸湿性が高いので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してテープ等で封をし、なるべく1日以内に服用すること。
- (5) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を用いた製品なので、製品により色調等が異なることがあるが、効能・効果には変わりありません。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171(代)

発 売 元 ジェーピーエス製薬株式会社
横浜市都筑区東山田4-42-22
製造販売元 三 和 生 薬 株 式 会 社
宇都宮市平出工業団地6-1