

生薬製剤

アコニンサン糖衣錠

アコニンサン糖衣錠は、日局ブシ末を飲み易い糖衣錠にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	下痢
そ の 他	どうき、のぼせ

- (2) 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 吸湿しやすいため、服用のつどビンのフタをよくしめること。
- (5) 本剤をぬれた手で扱わないこと。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがある。

〔効能・効果〕

鎮痛 強心 利尿

〔用法・用量〕

次の1回量を1日3回服用すること。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	3 錠
15 才 未 満	服用しないこと

〔成分・分量〕

本品1日量……………9錠(1錠0.4g)中

日局ブシ末……………1800.0mg

添加物として、トウモロコシデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Ca、精製セラック、タルク、白糖、沈降炭酸Ca、ゼラチン、アラビアゴム、酸化チタン、サラシミツロウ、カルナウバロウを含有しています。

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171

発 売 元 ジェーピーエス製薬株式会社
横浜市都筑区東山田4-42-22
製造販売元 三 和 生 薬 株 式 会 社
宇都宮市平出工業団地6-1