

生薬製剤
アコニンサン糖衣錠

アコニンサン糖衣錠は、日局ブシ末を飲み易い糖衣錠にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	下痢
そ の 他	動悸、のぼせ

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

鎮痛 強心 利尿

〔用法・用量〕

次の1回量を1日3回服用してください。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	3 錠
15 才 未 満	服用しないこと

〔成分・分量〕

本品1日量……………9錠(1錠0.4g)中

日局ブシ末……………1800.0mg

添加物として、トウモロコシデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Ca、精製セラック、タルク、白糖、沈降炭酸Ca、ゼラチン、アラビアゴム、酸化チタン、サラシミツロウ、カルナウバロウを含有しています。

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 吸湿しやすいため、服用のつどビンのフタをよくしめてください。
- (5) 乾燥剤は捨てないでください。また、誤って飲み込まないようにしてください。
- (6) 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室

東京都千代田区外神田6-6-1

TEL 03-3834-2171(代)

(月～金曜日 10:00～17:00 但し祝日を除く)

発 売 元 ジェーピーエス製薬株式会社

横浜市都筑区東山田4-42-22

製造販売元 三 和 生 薬 株 式 会 社

宇都宮市平出工業団地6-1