

じゅう み はいどくとう

十味敗毒湯 A エキス細粒「分包」 三和生薬

十味敗毒湯 A エキス細粒「分包」三和生薬は、漢方処方「十味敗毒湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 高齢者。
- (6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。
むくみ
- (8) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1 ヶ月位（化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期に服用する場合には 1 週間位）服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

4. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	1 包
7 才～14 才	2/3 包
4 才～6 才	1/2 包
4 才未満	服用しないこと

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品 1 日量 3 包（1 包 2.0 g）中

十味敗毒湯 A 水製エキス …………… 3.8 g

サイコ …………… 3.0 g	ブクリョウ …… 3.0 g
オウヒ …………… 3.0 g	ドクカツ …… 1.5 g
キキョウ …………… 3.0 g	ハマボウフウ … 1.5 g
ショウキョウ …… 1.0 g	カンゾウ …… 1.0 g
センキュウ …… 3.0 g	ケイガイ …… 1.0 g

添加物として乳糖、セルロース、アルファー化デンプン、ステアリン酸 Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171（代）

適応症

体力中等度なものの皮膚疾患で、発赤があり、ときに化膿するものの次の諸症：

化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、湿疹・皮膚炎、水虫

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。

三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地 6-1