

はんげ しゃ しんとう

半夏瀉心湯 A エキス細粒「分包」 三和生薬

半夏瀉心湯 A エキス細粒「分包」三和生薬は、漢方処方「半夏瀉心湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
間 質 性 肺 炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1 ヶ月位（急性胃腸炎、二日酔、げっぷ、胸やけに服用する場合には 5～6 回）服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	1 包
7 才～14 才	2/3 包
4 才～6 才	1/2 包
4 才 未 満	服用しないこと

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品 1 日量 3 包（1 包 2 g）中

半夏瀉心湯 A 水製エキス 3.9 g

ハ ン ゲ 4.0 g	カンゾウ 2.0 g
オウゴン 2.0 g	タイソウ 2.0 g
カンキョウ 2.0 g	オウレン 0.8 g
ニンジン 2.0 g	

添加物として乳糖、セルロース、アルファー化デンプン、ステアリン酸 Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171（代）

適応症

体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるものの次の諸症：

急・慢性胃腸炎、下痢・軟便、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症



三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地 6-1

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。