

はんげびやくじゅつてんま とう

半夏白朮天麻湯 A エキス錠 三和生薬

半夏白朮天麻湯 A エキス錠 三和生薬は、漢方処方「半夏白朮天麻湯」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合

成 分

本品 1 日量 18 錠（1 錠 0.35 g）中

半夏白朮天麻湯 A 水製エキス …………… 2.9 g

ハ ン ゲ …… 1.8 g	シ ン キ ャ …… 1.2 g
ビ ャ ク ジ ュ ツ …… 1.8 g	オ ウ ギ …… 0.9 g
チ ン ピ …… 1.8 g	ニ ン ジ ン …… 0.9 g
ブ ク リ ヨ ウ …… 1.8 g	タ ク シ ャ …… 0.9 g
バ ク ガ …… 1.2 g	オ ウ バ ク …… 0.6 g
テ ン マ …… 1.2 g	カ ン キ ヨ ウ …… 0.6 g
シ ヨ ウ キ ヨ ウ …… 0.3 g	

添加物として乳糖、セルロース、アルファー化デンプン、カルメロース Ca、カルメロース、ステアリン酸 Ca、無水ケイ酸、メタケイ酸アルミン酸 Mg を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

適応症

体力中等度以下で、胃腸が弱く下肢が冷えるものの次の諸症：

頭痛、頭重、立ちくらみ、めまい、蓄膿症（副鼻腔炎）

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	6 錠
7 才～14 才	4 錠
5 才～ 6 才	3 錠
5 才 未 満	服用しないこと

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171（代）

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。



三 和 生 薬 株 式 会 社
宇都宮市平出工業団地 6-1