

りょうけいじゅつかんとう

# **苓桂朮甘湯 A エキス細粒 三和生薬**

苓桂朮甘湯 A エキス細粒 三和生薬は、漢方処方「苓桂朮甘湯」の水製エキスを服用しやすい細粒にしたものです。



## **使用上の注意**



### **相談すること**

#### **1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。  
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

#### **2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること**

##### **(1) 服用後、次の症状があらわれた場合**

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症 状 の 名 称 | 症 状                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。 |

##### **(2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合**

#### **3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること**

## **成 分**

本品 1 日量 (4.5 g) 中

苓桂朮甘湯エキス ..... 1.7 g

|              |     |
|--------------|-----|
| ブクリョウ .....  | 6 g |
| ケ イ ヒ .....  | 4 g |
| ビャクジュツ ..... | 3 g |
| カンゾウ .....   | 2 g |

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、セルロース、アルファー化デンプン、ステアリン酸 Ca、無水ケイ酸を含有する。

## **保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

## **● お問い合わせ先**

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171 (代)

## **適応症**

体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症：

立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。

## **用法・用量**

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

| 年 令         | 1 回 量   |
|-------------|---------|
| 大人 (15 才以上) | 1.5 g   |
| 7 才～14 才    | 1.0 g   |
| 4 才～ 6 才    | 0.75 g  |
| 4 才 未 満     | 服用しないこと |

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。



三 和 生 薬 株 式 有 限 公 司  
宇都宮市平出工業団地 6-1