

しょうさい こ とう

小柴胡湯 A エキス細粒「分包」 三和生薬

小柴胡湯 A エキス細粒「分包」三和生薬は、漢方処方「小柴胡湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 高齢者。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人。
肝臓病、高血圧、心臓病、腎臓病
- (8) インターフェロン製剤で治療を受けている人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
間 質 性 肺 炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、 発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむく む、まぶたが重くなる、手がこわ ばる、血圧が高くなる、頭痛等が あらわれる。
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目 が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1 ヶ月位（かぜの後期の諸症状に服用する場合には1週
間位）服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	1 包
7才～14才	2/3 包
4才～6才	1/2 包
4 才 未 満	服用しないこと

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに
服用させること。

成 分

本品1日量3包（1包2.0 g）中

小柴胡湯 A 水製エキス 3.7 g

サ イ コ 4.8 g	ニンジン 2.4 g
ハ ン ゲ 4.0 g	カンゾウ 1.6 g
オウゴン 2.4 g	ショウキョウ 0.8 g
タイソウ 2.4 g	

添加物として乳糖、セルロース、アルファー化デンプン、
ステアリン酸 Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管する
こと。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり
品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
又は下記にお願い致します。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171（代）

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が
異なることもございますが、効能・効果には変わりございま
せん。

適応症

体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけ
て苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくもの
の次の諸症：

食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜ
の後期の諸症状



三 和 生 薬 株 式 会 社
宇都宮市平出工業団地 6 - 1