

けいしぶくりょうがんりょう

桂枝茯苓丸料 A エキス細粒 三和生薬

桂枝茯苓丸料 A エキス細粒 三和生薬は、漢方処方「桂枝茯苓丸」の水製エキスを服用しやすい細粒にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の
継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は
薬剤師に相談すること
下痢

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	1.5 g
7 才～14 才	1.0 g
4 才～6 才	0.75 g
4 才未満	服用しないこと

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに
服用させること。

成 分

本品 1 日量（4.5 g）中

桂枝茯苓丸エキス 2.6 g

ケイヒ 4 g	トウニン 4 g
ブクリョウ 4 g	シャクヤク 4 g
ボタンピ 4 g	

添加物として乳糖、セルロース、アルファー化デンプン、
ステアリン酸 Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して
保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり
品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
又は下記にお願い致します。

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171（代）

適応症

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、
のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症^{注)}、
肩こり、めまい、頭重、打ち身（打撲症）、しもやけ、しみ、
湿疹・皮膚炎、にきび

〈適応症に関連する注意〉

注)：血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など
女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいら
だちなどの精神神経症状および身体症状のことであ
る。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が
異なることもございますが、効能・効果にはかわりござい
ません。



三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地 6-1