

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

## 漢方薬

第2類医薬品

# 桂枝茯苓丸料Aエキス細粒「分包」三和生薬

ケイシブクリョウガンリョウ

## 製品の特徴

桂枝茯苓丸は、漢方の原典と言われる「きんぎやうりやく金匱要略」に収載されている漢方処方方で、比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴える方の、月経不順、月経痛、更年期障害、打ち身、しもやけ、しみなどに用いられます。

桂枝茯苓丸料Aエキス細粒「分包」三和生薬は、桂枝茯苓丸をエキス化し、服用しやすい細粒にした製品です。



## 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器  | 食欲不振      |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状                                               |
|-------|---------------------------------------------------|
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症<sup>注</sup>、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ、湿疹・皮膚炎、にきび

### <効能・効果に関する注意>

注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

## 用法・用量

1回下記量を食前又は食間に水又はお湯と一緒に服用してください。

| 年 齢       | 1 回 量       | 1 日服用回数 |
|-----------|-------------|---------|
| 大人（15才以上） | 1 包         | 3 回     |
| 7才以上15才未満 | 2/3 包       |         |
| 4才以上7才未満  | 1/2 包       |         |
| 4才未満      | 服用させないでください |         |

食間とは、「食事と食事の間」という意味です。食事のあと2時間ぐらいたったところで服用してください。

### <用法・用量に関する注意>

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量 (3包(4.5g)中)

桂枝茯苓丸エキス……………2.6g

|              |              |
|--------------|--------------|
| ケイヒ……………4g   | ブクリョウ……………4g |
| ボタンビ……………4g  | トウニン……………4g  |
| シャクヤク……………4g |              |

添加物として、乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがあります。が、効果に変わりはありません。

### お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

☎ 03-3293-3363

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)



販売元

**湧永製薬株式会社**

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

http://www.wakunaga.co.jp/



製造販売元

**三和生薬株式会社**

宇都宮市平出工業団地6-1