

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読み下さい。

第2類医薬品

漢方薬

六君子湯 Aエキス細粒「分包」三和生薬 リックンシトウ

製品の特徴

六君子湯は、中国明時代に著された「万病回春^{まんびょうかいしゅん}」に記載されている漢方処方で、体力が中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすい方の、胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐に用いられます。

六君子湯 Aエキス細粒「分包」三和生薬は、六君子湯をエキス化し、服用しやすい細粒にした製品です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

- (2) 1カ月位服用しても症状がよくならない場合

効能・効果

体力中等度以下で、胃腸が弱く、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：

胃炎、胃腸虚弱、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

用法・用量

1 回下記量を食前又は食間に水又はお湯と一緒に服用して下さい。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人（15才以上）	1 包	3 回
7才以上15才未満	2/3 包	
4才以上7才未満	1/2 包	
4才未満	服用させないで下さい	

食間とは、「食事と食事の間」という意味です。食事のあと2時間ぐらいたったところで服用して下さい。

<用法・用量に関する注意>

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量（3包（6.0g）中）

六君子湯A水製エキス……………3.9g

ニンジン……………3.2g	ビャクジュツ……………3.2g	ブクリョウ……………3.2g
ハング……………3.2g	チンピ……………1.6g	ショウキョウ……………0.4g
タイソウ……………1.6g	カンゾウ……………0.8g	

添加物として、乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 1 包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (6) 本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがあります。が、効果に変わりはありません。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 東京支社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2 丁目 5-1

(03) 3293-3363（ダイヤルイン）

（月～金曜日 9：00～12：00、13：00～17：00 但し祝日を除く）



販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

<http://www.wakunaga.co.jp/>

製造販売元



三和生薬株式会社

宇都宮市平出工業団地6-1