

だいさい こう

大柴胡湯 A エキス細粒「分包」 三和生薬

大柴胡湯 A エキス細粒「分包」三和生薬は、漢方処方「大柴胡湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
間 質 性 肺 炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、 発熱等があらわれる。
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が 黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位（常習便秘、高血圧や肥満に伴う便秘に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	1 包
7才～14才	2/3 包
4才～6才	1/2 包
4 才 未 満	服用しないこと

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品1日量3包（1包2.0g）中

大柴胡湯 A 水製エキス 4.0 g

サイコ 4.2 g	タイソウ 2.1 g
ハンゲ 2.8 g	キジツ 1.4 g
オウゴン 2.1 g	ショウキョウ 1.4 g
シャクヤク 2.1 g	ダイオウ 0.7 g

添加物として乳糖、セルロース、アルファー化デンプン、ステアリン酸 Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171（代）

三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地6-1

適応症

体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症：

胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。