

ぼうふうつうしょうさんりょう

防風通聖散料 A エキス錠 三和生薬

防風通聖散料Aエキス錠 三和生薬は、漢方処方「防風通聖散」の水製エキスを服用しやすい錠剤にしたものです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - (5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

 まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
間 質 性 肺 炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
 - (2) 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

適応症

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：

高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症（副鼻腔炎）、湿疹・皮膚炎、ふきでもの（にきび）、肥満症

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	6錠
7才～14才	4錠
5才～6才	3錠
5才未満	服用しないこと

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品1日量18錠（1錠0.35g）中

防風通聖散料A水製エキス …………… 2.7g

トウキ …………… 0.60g	マオウ …………… 0.60g
シャクヤク …………… 0.60g	ダイオウ …………… 0.75g
センキュウ …………… 0.60g	乾燥硫酸ナトリウム …………… 0.375g
サンシシ …………… 0.60g	キキョウ …………… 1.00g
レンギョウ …………… 0.60g	ビャクジュツ …………… 1.00g
ハ ッ カ …………… 0.60g	カンゾウ …………… 1.00g
ショウキョウ …………… 0.15g	オウゴン …………… 1.00g
ケイガイ …………… 0.60g	セッコウ …………… 1.00g
ハマボウフウ …………… 0.60g	カッセキ …………… 1.50g

添加物として乳糖、セルロース、アルファー化デンプン、カルメロースCa、カルメロース、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

三和生薬株式会社
TEL 03-3834-2171（代）三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地6-1

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。