

りゅうたん しゃ かんとう

竜胆瀉肝湯 A エキス細粒「分包」 三和生薬

竜胆瀉肝湯 A エキス細粒「分包」 三和生薬は、漢方処方「竜胆瀉肝湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

下 痢

成 分

本品 1 日量 3 包（1 包 2.0 g）中

竜胆瀉肝湯 A 水製エキス 4.0 g

シャゼンシ 2.1 g	トウキ 3.5 g
オウゴン 2.1 g	サンシシ 0.7 g
タクシャ 2.1 g	カンゾウ 0.7 g
モクツウ 3.5 g	リュウタン 0.7 g
ジオウ 3.5 g	

添加物として乳糖，セルロース，アルファー化デンプン，ステアリン酸 Ca，無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171（代）

適応症

体力中等度以上で、下腹部に熱感や痛みがあるものの次の諸症：

排尿痛、残尿感、尿のにごり、こしけ（おりもの）、頻尿

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	1 包
7 才～14 才	2/3 包
4 才～ 6 才	1/2 包
4 才 未 満	服用しないこと

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。



三和生薬株式会社

宇都宮市平出工業団地 6-1