

うおのめ・たこ・いぼ用薬

コーンプラスターワンタッチ

うおのめは、中央にかたくなった角質の隆起がみられるものです。上から押すと痛みがあります。

たこは、扁平でかたい隆起がみられるものです。押しても痛みはありません。

いぼは通常、ウイルスの表皮感染によっておこる皮膚の部分的変化です。普通にみられるいぼは、半球状で表面がザラザラとしていて、とくに学童や青年の手の甲や指、爪のまわりなどに発生しやすく、尋常性いぼと呼ばれています。

コーンプラスターは、角質のはく離剤である「サリチル酸絆創膏」と圧迫による痛みを緩和する「保護用粘着パッド」を絆創膏に貼り付けた製品で、簡単に患部の手当ができます。

サリチル酸絆創膏は、サリチル酸の角質軟化溶解作用を利用し、うおのめ、たこ、いぼを除去するものです。温浴で角質を軟化させてから使用すると効果的です。

なお、本剤の使用が適当でない部位又は症状のものもありますので、「使用上の注意」及び「こんないぼには要注意!!」をよく読んでからお使いください。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位又は症状には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜、やわらかい皮膚面(首の回り等)、顔面等。
- (2) 炎症又は傷のある患部。
- (3) みずいぼ。
- (4) 湿ったいぼ。
- (5) 群生したいぼ、身体に多発したいぼ。
- (6) 外陰部や肛門のまわりにできたいぼ(尖形いぼ)。
- (7) 褐色か黒色の扁平に隆起したいぼ(老人性いぼ)。
- (8) 掻き傷にそって一列にできることがある若年性扁平いぼ。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 乳幼児。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

うおのめ、たこ、いぼ

用法・用量

絆創膏を台紙からはぎとり、中央部のサリチル酸絆創膏が患部を覆うように貼りつけてください。

※およそ5日目ごとに取りかえてください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 患部の周りの皮膚につかないよう、よく注意して使用してください。

成分・分量

膏体100g中 サリチル酸50g

添加物：精製ラノリン、ロジンエステル、他2成分

保管及び取扱い上の注意


- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は使用しないでください。

用途によって使い分けてください

薬剤部分が健康な皮膚に付着すると、その部分も白く軟化し、痛むこともありますので、患部の大きさに合わせて**S・M・L**の各サイズを使い分けてください。


S(薬剤部分5mm)12枚入

小さい**いぼ・たこ・うおのめ**に




M(薬剤部分8mm)10枚入

通常の**うおのめ・たこ・いぼ**に



L(薬剤部分12mm)8枚入

足の裏の**うおのめ・たこ・いぼ**に



効果的な使い方

1. サリチル酸絆創膏は患部に長く密着させておくことが大切です。毎日交換するとかえって治療を遅らせますので、およそ5日目ごとに取りかえてください。
2. はりかえの際、白く軟化した角質をピンセット等で、つまみ取ります。
3. 特にうおのめは**しん**(角質柱)を完全に取り除かないと再発しますので繰り返しご使用ください。

※温浴で患部をやわらかくし、よく拭いてからご使用になると一層効果的です。

こんないぼには要注意!!

■医師に相談してください

【若天性扁平いぼ】

できやすい場所: 手の甲

でき方: 掻き傷にそって一列にいぼがなることがある。

※手の甲にいぼがあれば、顔にいぼがみつかることも多い。



【尖形いぼ】

できやすい場所: 外陰部、肛門の周囲等ただれやすい場所

でき方: いぼ状に隆起している。表面はにわとりのとさかのように乾いている場合と、湿っている場合がある。



【老人性いぼ】

できやすい場所: 顔、くび、背中、手の甲等

でき方: 褐色か黒色の扁平に隆起したいぼ。角化し、硬い悪性の腫物もあるので、医師に診てもらうこと。



本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間: 月～金 (祝日を除く) 9:00～17:00



発売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14



製造販売元 阿蘇製薬株式会社 熊本県菊池郡菊陽町津久礼91-1