



# 第3類医薬品

日本薬局方

消毒用エタノール

日本薬局方

消毒用エタノール

\* 2012年5月改訂

\*

ご使用前にラベルをよく読み正しくお使い下さい。  
また、必要なときに読めるよう保管して下さい。

日本薬局方

## 消毒用エタノール

(サンケミファ)

### ※ ⚠ 【使用上の注意】

#### ❌ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります】

1. 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に貼付しないこと。
2. 次の部位に使用しないこと。  
目や目の周囲、粘膜(口唇等)

#### \* 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
  - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4) 患部が広範囲の人
  - (5) 深い傷やひどいやけどの人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、この文章を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

| 関係部位 | 症状        |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |

【効能・効果】創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】本剤を脱脂綿、ガーゼ等に浸して、患部に軽く塗布してください。

＜用法・用量に関する注意＞

- ① 定められた用法、用量を厳守してください。
- ② 外用にのみ使用し、内服しないでください。
- ③ 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- ④ 小児に使用する場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

【成分及び分量】本剤はエタノール76.9～81.4vol%を含みます。

【保管及び取扱い上の注意】

- ① 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない所に密栓して保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。
- ③ 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。

\* ④ 本剤はニスを溶かすので、ニスの塗ってある建具や家具等には本剤が付着しないように注意してください。

【消費者相談窓口】 サンケミファ(株) TEL 022-394-3031

製造販売元 **サンケミファ株式会社**

仙台市青葉区芋沢字大竹新田 8-1

副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931

第4類・アルコール類

水溶性・危険等級Ⅱ

火気厳禁

製造番号

使用期限

折りたたんで  
廃棄しやすい  
ボトルを採用



溝のある方をつぶす。



溝にそってたたむと  
きちんとたためて  
空気も入りません。

つぶせるボトルなので  
寒冷時には、へこみ等、  
変形することがあります  
が品質には変わりな  
くお使いいただけます。

JAN

GS1-RSS



4



(01)14987468100400



キャップ: PP  
ボトル: PE  
ラベル: PP

500mL