



指定医薬部外品

消毒用エタノール E80

2012年5月改訂(第3版)

手指消毒剤

消毒用エタノール

E80

第4類・アルコール類・水溶性・危険等級Ⅱ・火気厳禁

製造販売元

サンケイファ株式会社

仙台市青葉区芋沢字大竹新田 8-1
お客様相談室 TEL(022)394-3031

* ご使用前にラベルをよく読み正しくお使い下さい。
また、必要なときに読めるよう保管して下さい。

※**△【使用上の注意】**

❌してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]

次の人は使用しないこと。

- (1) 患部が広範囲の人。
- (2) 深い傷やひどいやけどの人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 5～6日間使用しても症状が良くならない場合。

【販売名】

アルコクリンE80

【効能・効果】

手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】

そのまま手指又は皮膚に噴霧又は塗布する。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 眼に入らないよう注意すること。万一、眼に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合は、眼科医の診療を受けること。
- (4) 外用にのみ使用すること。

【成分及び分量】

エタノール(C₂H₆O)76.9～81.4vol%を含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (2) 直射日光を避け、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
- (3) 誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないこと。
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 薬剤が床や家具等に付着しないように注意すること。(変質又は変色のおそれがあります。)
- (6) 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。

折りたたんで
廃棄しやすい
ボトルを採用



溝のある方をつぶす。



溝にそってたたむと
きちんとたためて
空気も入りません。

つぶせるボトルなので
寒冷時には、へこみ等、
変形することがありますが
品質には変わりなく
お使いいただけます。



4



キャップ: PP
ボトル: PE
ラベル: PP

500mL

製造番号

使用期限