

## 第②類医薬品

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。

## 半夏厚朴湯エキス配合感冒薬

## JPS かぜ 5号錠

かぜをひくと、一般的に鼻水、くしゃみ、のどの痛みなどの症状があらわれます。さらに症状が進むと熱がでたり、からだがだるい、せきができるなどの症状になります。

JPSかぜ5号錠はこうしたかぜの諸症状を緩和する成分とともに漢方処方の半夏厚朴湯エキスを配合しました。

特にせきやたんの激しいかぜの症状にすぐれた効果をあらわします。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

## 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 12才未満の小児。

## 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

## 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

## 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

## 5. 服用前後は飲酒しないでください

## 6. 長期連用しないでください



## 相談すること

## 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
- (5) 次の診断を受けた人。

心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

## 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。

(裏面につづく)

間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症 呼吸抑制	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## 【用法・用量】

次の量を食後なるべく30分以内に水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	3錠	3回
12才以上15才未満	2錠	
12才未満	服用しないこと	

### （用法・用量に関連する注意）

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 【成分・分量】

9錠中に次の成分を含有しています。

成分	含量(9錠中)	作用
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、痛みを和らげます。
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せきを和らげます。
d-クロロフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	かぜのアレルギー症状(鼻水・くしゃみ)をおさえます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	200mg	のどにからむたんをやわらかくし、出しやすくします。
無水カフェイン	75mg	頭痛を和らげます。
フルスルチアミン塩酸塩	20mg	ビタミンB <sub>1</sub> を補給し、体力の回復をたすけます。
半夏厚朴湯乾燥エキス	725mg	せき、たん、鼻水、くしゃみなどを緩和します。

添加物として、無水ケイ酸、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、ショ糖脂肪酸エステル、サッカリンNa、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプンを含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- 吸湿しやすいため、服用のつどピンのフタをよくしめてください。
- 本剤は生薬（薬用の草根木皮等）を用いた原料を使用していますので、製品により色調等が異なることがあります。効能・効果には変わりありません。
- 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。

ジェーピーエス製薬 お客様相談室

電話 045-593-2136

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22