

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。又、必要な時に読めるように大切に保管してください。

柴胡桂枝湯エキス  
配合感冒薬

**スズレックスD**

第2類医薬品



くしゃみ、鼻水、発熱、頭痛など、かぜの症状がではじめたら、こじらせる前にできるだけ早く治すことが大切です。スズレックスDは、漢方処方の柴胡桂枝湯エキスと解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤、鎮咳剤、去痰剤などを効果的に配合した錠剤タイプのかぜ薬で、かぜの諸症状をやわらげ、健康な体への回復をたすけます。

**⚠ 使用上の注意**

**❌ してはいけないこと**

- （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）
1. 次の人は服用しないでください  
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
  2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
  3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります。）
  4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
  5. 服用前後は飲酒しないでください
  6. 長期連用しないでください



**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難  
(5) 次の診断を受けた人。  
心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症※
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



| 関係部位  | 症 状                |
|-------|--------------------|
| 皮膚    | 発疹・発赤、かゆみ          |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振        |
| 精神神経系 | めまい                |
| 泌尿器   | 排尿困難、頻尿、排尿痛、血尿、残尿感 |
| その他   | 過度の体温低下            |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称                                                         | 症 状                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ショック<br>（アナフィラキシー）                                            | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。                                |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>（スティーブンス・ジョンソン症候群）、<br>中毒性表皮壊死融解症、<br>急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 肝機能障害                                                         | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                                          |
| 腎障害                                                           | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。                                            |
| 間質性肺炎                                                         | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。                         |

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| ぜんそく    | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。                                 |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症   | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。                                           |
| 呼吸抑制※   | 息切れ、息苦しさ等があらわれる。※                                                 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## 【用法・用量】

下記の量を 1 日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

| 年 齢        | 1回量         | 1日服用回数 |
|------------|-------------|--------|
| 成人（15歳以上）  | 3錠          | 3回     |
| 11歳以上15歳未満 | 2錠          |        |
| 11歳未満の乳幼児  | 服用しないでください。 |        |



### ＜用法・用量に関連する注意＞

1. 用法及び用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
3. 12歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。※


## 【主成分とその主な作用】

| 成 分                                            | 9錠中    | 主 な 作 用                                  |
|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| 柴胡桂枝湯乾燥エキス<br>(柴胡、半夏、桂皮、芍薬、黄芩、<br>人参、大枣、甘草、生姜) | 1000mg | 発熱、悪寒、頭痛、関節の痛み、はき気などのある<br>かぜに特に効果があります。 |
| アセトアミノフェン                                      | 900mg  | 熱を下げ、頭痛、関節の痛みをやわらげます。                    |
| ジヒドロコデインリン酸塩                                   | 24mg   | せきをしずめます。                                |
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩                              | 3.5mg  | かぜのアレルギー症状(鼻水・くしゃみ)をおさえます。               |
| グアヤコールスルホン酸カリウム                                | 150mg  | のどにからむ痰をやわらかくし、出やすくします。                  |
| フルスルチアミン塩酸塩                                    | 20mg   | ビタミンB <sub>1</sub> を補給し、体力の回復をたすけます。     |

※添加物として、サッカリンNa、トウモロコシデンプン、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸を含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。

ホーユー株式会社 お客様相談室 TEL (052) 935-9941

受付時間：土・日・祝日及び弊社休業日を除く午前9時～午後5時

発売元

**hoYu** ホーユー株式会社  
名古屋市中区徳川一丁目501

製造販売元

**ジェーピーエス製薬株式会社**  
栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1